



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κοζάνη 30/12/2005

Αριθμ. Πρωτ. - 3001-

Ταχ. Δ/ση : Ζ.Ε.Π. - Κοζάνη
Ταχ. Κώδικας : 50100
Πληροφορίες : **Α. Μούντζιας**
Τηλέφωνο : 24610-53516
Τηλεομοιότυπο : 24610-53506
Ηλεκτρ. δ/ση : dgean@pdm.gr

ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Περιφέρειας

ΚΟΙΝ. : Υπουργείο Γεωργίας
Γενική Διεύθυνση
Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής
Αχαρνών 2
101 76 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Καθορισμός προωθούμενων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2005-2006.

ΣΧΕΤ. : 1. Την υπ' αριθμ. 242527/12-01-2005 Απόφαση Υφυπουργού Α.Α. & Τ.
2. Την υπ' αριθμ. 274617/27-04-2005 Απόφαση Υφυπουργού Α.Α. & Τ.
3. Το υπ' αριθμ. 3433/05-08-2005 έγγραφο της Ν.Α. Γρεβενών.
4. Το υπ' αριθμ. ΚΗ/7856/13-09-2005 έγγραφο της Ν.Α. Καστοριάς.
5. Το υπ' αριθμ. 6854/02-06-2005 έγγραφο της Ν.Α. Κοζάνης.
6. Την υπ' αριθμ. 8474/09-08-2005 Απόφαση της Ν.Α. Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών.
2. Την υπ' αριθμ. 242527/12-01-2005 Απόφαση Υφυπουργού Α.Α. & Τ.
3. Την υπ' αριθμ. 274617/27-04-2005 Απόφαση Υφυπουργού Α.Α. & Τ.
4. Τις σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε για τη χρονική περίοδο από 01-01-2006 μέχρι 31-12-2006 τα είδη και τις ποικιλίες των δενδροκτηπευτικών καλλιεργειών που προωθούνται και για τις οποίες παρέχονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4035/60 ενισχύσεις καθώς και τις περιοχές όπου θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα επέκτασης και βελτίωσης των καλλιεργειών αυτών.

1. Περιοχή Νομού Γρεβενών :

Αυτή περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές του Δήμου Γρεβενών και των Κοινοτήτων Καλοχίου, Κνίδης, Μυρσίνας, Βατολάκκου, Ελευθέρου, Κοκκινιάς, Πολυδένδρου, Μεγ. Σειρηνίου, Αμυγδαλιάς, Ελάτου, Κυρακαλής, Συνδένδρου, Μαυραναίων, Αναβρυτών, Ζιάκα, Σπηλαίου, Τρικώμου, Κοσματίου, Πηγαδίτσας και Κηπουρείου.

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

A. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1) Μηλιά

Μόνο σε περιοχές των Νομών όπου δεν έχουν εμφανισθεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

- α) Από τις πρώιμες ποικιλίες, οι ποικιλίες GALA & ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της MONDIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY και ROYAL GALA.
- β) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, STARKRIMSON TOPRED, RED CHIEF και OREGON SPUR σε ορεινές αρδευόμενες περιοχές καθώς και η όψιμη ποικιλία PINK LADY σε ημιορεινές περιοχές.
- γ) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι REINDERS, SMOOTHIE, και GOLDEN B.
- δ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED και με την πρόβλεψη να φυτεύονται απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση στις ορεινές αρδευόμενες περιοχές.
- ε) Από τις όψιμες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της FUJI RED, NAGAFU 12, LYND SPUR.
- στ) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές καθώς και όπου προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων.
- ζ) Η ποικιλία GRANNY SMITH
- η) Η Ελληνική ποικιλία ΦΥΡΙΚΙ, ιδιαίτερα οι μεγαλόκαρπες μεταλλαγές της.

Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να εγκαθίστανται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα M-9, M-26, MM-111 και MM-106, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού. Οι κλώνοι τύπου SPUR πρέπει να εμβολιάζονται μόνο στα ημινάνα υποκείμενα MM-106 και MM-111, εκτός ειδικών περιπτώσεων στις ημιγόνιμες περιοχές του Νομού για την αντιμετώπιση

προβλημάτων καλής στήριξης από ζημιές των χιονοπτώσεων, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σπορόφυτα.

2) Αχλαδιά

α) Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς.

Οι παραπάνω ποικιλίες προωθούνται εφόσον μετά από συνεννόηση της Διεύθυνσης Γεωργίας και του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κριθεί ότι μπορεί να ενταχθεί η καλλιέργεια της αχλαδιάς στα προγράμματα της περιοχής.

Β. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1) Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT με τους επικονιαστές τους.

2) Δαμασκηλιά

α) Για επιτραπέζια δαμάσκηνα, η ποικιλία PRESIDENT με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY.

β) Για αποξηραινόμενα δαμάσκηνα οι ποικιλίες ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY.

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1) Καρυδιά και Καστανιά

Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1) Βατόμουρα και Σμέουρα

Σύμφωνα με την αριθμ. 1482/6-3-97 απόφαση Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Γρεβενών και μέχρι εκδόσεως νεωτέρας η καλλιέργεια των βατόμουρων και σμέουρων εντάσσονται στις αποθαρρυνόμενες λόγω του προβλήματος διάθεσης των προϊόντων. Οι ποικιλίες ZEVA και HALLING EXPLOIT, THORNLESS EVERGREEN, THORNFREE.

II. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες : G C 204, DOMBO, DOMBITO, ROBIN, JOLLY, KARUZO, A 200, BERMOYDA, ALONSO, κ.λ.π.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτικά υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμήσει στις Ελληνικές συνθήκες και ιδιαίτερα το PERINEX, SABDRA,

KAMARON, VALORE, BAMBINA, BRUNEX, PALMERA, κ.λ.π. που έχουν όλα τα θηλυκά άνθη.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, κολοκυθιάς και πεπτονοειδών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Πρωθούνται οι ποικιλίες TIOGA, GORELLA, DOUGLAS, TORO, KRUZ, AJARO, AICO, BRIGATO, TUFT, κ.λ.π.

5. Τομάτα στο ύπαιθρο

Πρωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στο ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές.

7. Φράουλες στο ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες με ιδιαίτερη προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στις καλλιέργειες υπό κάλυψη.

8. Πατάτα

Πρωθούνται ποικιλίες που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκίμουν στις τοπικές συνθήκες όπως οι Sprunta, Agria, κ.α. καθώς και ποικιλίες για βιομηχανική χρήση.

9. Λοιπά κηπευτικά στο ύπαιθρο

Αρακάς, τοματοπιπεριά, αγγουράκι κονσερβοποίησης και μπάμια.

10. Μανιτάρια

Πρωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP. κ.λ.π. εδωδύμων μανιταριών, μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

11. Γενικά

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμώνται όσα αναφέρονται παραπάνω χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού τους και άλλες ποικιλίες και υβρίδια που θα υποδεικνύει η υπηρεσία μας και εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους στις τοπικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Για τα λοιπά κηπευτικά εκτός της πατάτας πρωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

III. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρυφαλλιά, τριανταφυλλιά, ζέρμπερα, στρελίτζια, ορχιδέες, βολβοειδή, χρυσάνθεμα, κ.λ.π.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.λ.π.

B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε ύπαιθρο με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) για την παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια

Βολβοειδή, γαρύφαλλα, κ.λ.π.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Φυτά κηποτεχνίας

Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της περιοχής.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται :

Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους και ο εκσυγχρονισμός των θερμοκηπίων που υπάρχουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθούνται :

Η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων, κυρίως οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

3. Επίσης προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων – ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Περιοχή Βεντζίων και Βοΐου

Αυτή περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων: Πυλωρών, Εξάρχου, Ποντινής, Παλαιοχωρίου, Σαρακήνας, Παναγιάς, Κέντρου, Αγ. Θεοδώρων, Καλλιθέας, Κρανέας, Μικρολείβαδου, Μοναχητίου, Φελιού, Αγ. Γεωργίου, Ταξιάρχη, Μηλέας, Κιβωτού, Κληματακίου, Αγ. Κοσμά, Ροδιάς, Κυδωνιών, Αηδονιών, Δασυλλίου, Καλλονής, Τρίκορφου, Κυπαρισσίου, Οροπεδίου, Μεγάρου, Καληράχης, Λάβδας, Πανοράματος, Πολυνερίου, Αλατόπετρας, Φιλιππαίων και Προσβόρου.

I. Δενδρώδη

Όπως αναφέρεται για την Α' περιοχή Γρεβενών

II. Κηπευτικά

Όπως αναφέρεται για την Α' περιοχή Γρεβενών

III. Κοσμητικά είδη και λοιπές δραστηριότητες

Όπως αναφέρεται για την Α' περιοχή Γρεβενών

Περιοχή Δεσκάτης – Χασίων

Αυτή περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές του Δήμου Δεσκάτης και των Κοινοτήτων Δασοχωρίου, Παρασκευής, Παλιουριάς, Καρπερού, Τρικοκιάς και Κατάκαλης.

- I. **Δενδρώδη**
Όπως αναφέρεται για την Α' περιοχή Γρεβενών
- II. **Κηπευτικά**
Όπως αναφέρεται για την Α' περιοχή Γρεβενών
- III. **Κοσμητικά είδη και λοιπές δραστηριότητες**
Όπως αναφέρεται για την Α' περιοχή Γρεβενών

2. Περιοχή Νομού Καστοριάς

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

A. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1. Μηλιά

Μόνο σε περιοχές των Νομών όπου δεν έχουν εμφανισθεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

Πρωθούνται οι ποικιλίες :

- α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι RED CHIEF, OREGON SPUR, STAR CRIMSON (SPUR) και STAR CRIMSON TOP RED, SCARLET SPUR.
- β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι SMOOTHIE, REINDERS και GOLDEN B.
- γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD και JONAGORED, με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.
- δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες, η ποικιλία GALA, OZARK GOLD και ειδικά οι κόκκινες μεταλλαγές της, όπως είναι η ROYAL GALA, MONDIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY.
- ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές καθώς και όπου προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων.
- στ) Από τις όψιμες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της FUJI RED, NAGA-FU 12, KIKU 8 και η ποικιλία PINK LADY σε ημιορεινές περιοχές.

Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να εγκαθίστανται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα M-9, M-26, MM-111 και MM-106. Οι κλώνοι τύπου SPUR πρέπει να εμβολιάζονται μόνο στα ημιανάνα υποκείμενα MM-111, εκτός ειδικών περιπτώσεων στις ημιγόνιμες περιοχές του Νομού για την αντιμετώπιση προβλημάτων καλής στήριξης από ζημιές των χιονοπτώσεων, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σπορόφυτα.

Για επαναφύτευση στα ορεινά χρησιμοποιούνται ζωηρότερα υποκείμενα κυρίως το MM-111 και το M4 όπου υπάρχει πρόβλημα με φυτόφθορα. Οι αναφερθείσες ποικιλίες πρωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Γρεβενών που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09-01-98 περί "καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση ένταξής τους σε Σχέδια Βελτίωσης, οι αναφερθείσες ποικιλίες πρωθούνται και στις κατάλληλες ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού, χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

2. Αχλαδιά

Κατ' εξαίρεση οι ποικιλίες WILLIAMS, HIGHLAND, KAIZER, COMFERENSE (Ανθεκτική στο βακτηριακό κάψιμο) και HARROW-SWEET, προωθούνται στο Νομό Καστοριάς μόνο για βιομηχανική χρήση. Από τις καλοκαιρινές η Β – C WILLIAMS (με ενδιάμεσο εμβολιασμό), CASCADE, HIGHLAND.

Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Γρεβενών που είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09-01-98 περί "καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής αχλαδιών, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών αχλαδιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση ένταξής τους σε Σχέδια Βελτίωσης, οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού, χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

Β. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN και VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές.

Ακόμη προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA σε περιοχές που κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (άνεμοι, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.).

2. Δαμασκησιά

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της «SHARKA» & επιπλέον για τις ιαπωνικού τύπου δαμασκησιές και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια

Οι ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT & STANLEY που αλληλο-επικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA.

β) Αποξηραινόμενα

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY.

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

Καρυδιά και Καστανιά

Όψιμες ποικιλίες που δοκιμάστηκαν στις τοπικές συνθήκες και συνιστώνται από τη Διεύθυνση Γεωργίας και τον Δενδροκομικό Σταθμό Σερβίων.

Καρυδιές: FRANQUETTE όψιμη για ορεινές περιοχές με επικονιαστή MEYLANNAISE ή RONDE DE MONTIGNAC.

Καστανιές: Οι ποικιλίες που δημιουργούνται από επιλογή των τοπικών ποικιλιών που παρουσιάζουν μια ανθεκτικότητα προσβολής από το μύκητα ENDOETHICA PARASITICA κυρίως τα υποκείμενα να είναι από άγρια της περιοχής και εμβολιάζονται με βελτιωμένες ποικιλίες, κυρίως MARONIA.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Βατόμουρα – Σμέουρα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS καθώς και διάφορα υβρίδια αυτών που συνιστώνται από τη Διεύθυνση Γεωργίας.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Όσον αφορά την άμπελο προωθούνται (κατά κατηγορία χρήσης) οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην απόφαση 237077/27-02-2004 «περί ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει.

Με βάση τον Καν. 1493/99 (ΝΕΑ ΚΟΑ) απαγορεύεται η επέκταση της αμπελοκαλλιέργειας οиноποιήσιμων ποικιλιών, εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και εφόσον οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται βάσει αδειάς της Δ/νσης Γεωργίας Καστοριάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές Διατάξεις.

Οι επιτραπέζιες ποικιλίες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των οиноποιήσιμων ποικιλιών όσον αφορά τη φύτευση, κατά την επιλογή όμως μιας επιτραπέζιας ποικιλίας που περιλαμβάνεται στην απόφαση ταξινόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εμπορική αξία σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του χρόνου συγκομιδής.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά CORTINA, ERNESTO, NAFSICA, IRON, INDALO, BIZON-F1-1255, JAMBO-F1, MANTHOS, NOA, κ.λ.π.

2. Τομάτα στην ύπαιθρο

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά ως ανωτέρω εφόσον εφαρμόζεται τεχνική για πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

3. Αγγούρι υπό κάλυψη

Βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που αποδεδειγμένα ευδοκίμουν στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PERINEX, KAMARON, VALDRE PALMERA, CADOR, VENUS, VIRGINIA 722, κ.λ.π.

4. Πατάτα

Πρωθούνται ποικιλίες που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες όπως οι Sprunta, Agria, κ.α. καθώς και ποικιλίες για βιομηχανική χρήση.

5. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεππονοειδών και κολοκυθιών.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Ποικιλίες και υβρίδια σε κατάλληλες αμώδεις εκτάσεις του Νομού μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας.

7. Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου

Αρακάς, τοματοπιπεριά και αγγουράκι κονσερβοποίησης.

8. Μανιτάρια

Πρωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP, κ.λ.π., μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας, σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα, την τοποθεσία και την τεχνική της καλλιέργειας.

10. Ψυχανθή

Φασόλια (γίγαντες, ελέφαντες, πλακέ), φακές, ρεβίθια, αρακάς, καθώς και αυτά που συμπεριλαμβάνονται σε σύστημα αμειψισποράς.

11. Γενικά

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε, χωρίς όμως να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια που θα υποδεικνύει η Διεύθυνση Γεωργίας ότι ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες.

Για τα λοιπά κηπευτικά εκτός της πατάτας, πρωθούνται εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζονται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

III. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.λ.π.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.λ.π.

B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Φυτά κηποτεχνίας

Όλα τα κατάλληλα είδη που ευδοκιμούν στο περιβάλλον της χώρας μας.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται :
 - α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.
 - β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπάρχοντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα.Όλα τα ανωτέρω θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, προωθείται η αγορά και χρήση των αντλητικών μηχανημάτων. Πολλαπλασιαστικό υλικό, μηχανήματα, εργαλεία της καλλιέργειας, σύστημα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.
3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπάρχοντων, κυρίως οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.
4. Προωθούνται επίσης οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων – ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

3. Περιοχή Νομού Κοζάνης

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

A. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1. Μηλιά

- α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, RED CHIEF, OREGON SPUR, STAR CRIMSON (τύπος SPUR) και STAR CRIMSON TOP RED σε ημιορεινές και ορεινές αρδευόμενες περιοχές.
- β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι GOLDEN B και REINDEERS.
- γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.
- δ) Από τις πρώιμες, η ποικιλία GALA και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της MODIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY και SINGHA. Επίσης η ποικιλία OZARK GOLD.
- ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές περιοχές.
- στ) Από τις όψιμες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της FUJI RED, NAGA FU 12, KIKU 8. Επίσης η ποικιλία PINK LADY σε ημιορεινές περιοχές.
- ζ) Η ποικιλία GRANNY SMITH σε πεδινές περιοχές.
- η) Η Ελληνική ποικιλία ΦΥΡΙΚΙ στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
 - Οι πιο πάνω ποικιλίες προωθούνται με ιδιαίτερη έμφαση στα Δ.Δ. Πύργων, Μεσόβουνου, Κομνηνών, Εμπορίου, Μηλοχωρίου, Φούφα, Δροσερού και στο ορεινό τμήμα των αγροκτημάτων Βελβεντού, Σερβίων και Πλατανορέυματος.
Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω, φυτεύονται σε πυκνή φύτευση και οπωσδήποτε στα υποκείμενα M-9, M-26 και MM-106.
 - Για επαναφύτευση στα ορεινά χρησιμοποιούνται ζωηρότερα υποκείμενα κυρίως το MM111 και το M4 όπου υπάρχει πρόβλημα με τη Φυτόφθορα. Οι κλώνοι τύπου SPUR πρέπει να εμβολιάζονται μόνο στα ημιανάνα υποκείμενα MM-106 και MM-111, εκτός ειδικών περιπτώσεων στις ημιγόνιμες περιοχές του Νομού για την αντιμετώπιση προβλημάτων καλής στήριξης από ζημιές των χιονοπτώσεων, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σπορόφυτα.
 - Διευκρινίζεται ότι σε μεμονωμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει καλλιέργεια μηλιάς, για να προωθηθεί πρέπει να γίνει προσεκτική εξέταση της περιοχής (θύλακες παγετού) και εργαστηριακή εδαφολογική εξέταση για την καταλληλότητα του εδάφους.

Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Κοζάνης που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν. (ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09-01-98 περί “καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου. **Ειδικότερα**, στην περίπτωση ένταξής τους σε Σχέδια Βελτίωσης, οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες ορεινές και ημιορεινές περιοχές του προαναφερόμενου Νομού, **χωρίς βέβαια** να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

2. Αχλαδιά

- α) 1. Από τις πρώιμες προτείνονται οι ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 1/6, 7/9 (Καλλιόπη) , BELLA DI GIUGNO , TOSCA, η ETRUSCA , η COSCIA και η SANTA MARIA.
2. Από τις καλοκαιρινές η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ (Τσακώνικη) και η Β.С. WILLIAMS (με ενδιάμεσο εμβολιασμό).
3. Από τις φθινοπωρινές η ABATE FETEL (με ενδιάμεσο εμβολιασμό ή δοκιμαστικά στην κυδωνιά Ε.Μ.С), η CASCADE, HIGHLAND, PACKHAMS TRIUMPH και CONFERENCE για επικονιαστές και η HARROW-SWEET.
- β) Σε πεδινές περιοχές προωθούνται οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς.
- γ) Οι ποικιλίες WILLIAMS, HIGHLAND, KAIZER, HARROW-SWEET προορίζονται **αποκλειστικά και μόνο για βιομηχανική χρήση**.
- δ) Στις φυτείες αχλαδιάς ποικιλίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σαν επικονιαστής η ποικιλία COSCIA, λόγω της ανθεκτικότητας της στο βακτηριακό κάψιμο.

Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Κοζάνης που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09-01-98 περί “καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών

φυτειών αχλαδιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

B. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Βερικοκιά

Σε περιοχές κατά το δυνατό μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δένδρۇλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. Προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές μη παγετόπληκτες περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης. Οι ανθεκτικές στην ίωση **Sharka** ποικιλίες AURORA και οι νέες ελληνικές επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας NOMIA, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, NINA και NAPHNA σε κατάλληλες περιοχές και μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Δαμασκηλιά

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της «SHARKA». και επιπλέον για τις Ιαπωνικού τύπου δαμασκηνίες και από τα μυκοπλάσματα .

α) Επιτραπέζια

Οι ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT & STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση «SHARKA».

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι όλες σχεδόν αυτόστειρες γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποφεύγεται η φύτευσή τους σε περιοχές με όψιμους παγετούς την άνοιξη και βροχοπτώσεις την περίοδο ανθοφορίας.

Επίσης οι ποικιλίες:

BLACK STAR με επικονιαστές τις **SANTA ROSA** και **BLACK GOLD**.

BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και **FORTUNE** με επικονιαστές τις **ANGELINO, BLACK GOLD, FRIAR**.

FRIAR με επικονιαστή τις **SANTA ROSA, LARODA**

BLACK AMBER με επικονιαστή τις **SANTA ROSA, FRIAR**

ANGELINO με επικονιαστές τις **BLACK GOLD**, και **SIMCA**

β) Αποξηραινόμενα

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D'ENTE 707 και η ANNA SPATH με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY.

Κατάλληλες τοποθεσίες είναι η περιοχή Τσοτυλίου και η παραλίμνια περιοχή της λίμνης ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ, ήτοι Νότια ζώνη (Πολύφυτο, Αγία Κυριακή, Βελβεντό, Πλατανόρευμα, Σέρβια, Ν. Λάβα, Κρανίδια, Αυλές, Γούλες, Ρύμνιο, Ελάτη, Φρούριο)

και Βόρεια ζώνη (Πολύμυλος, Ίμερα, Αύρα, Λεύκαρα, Νεράϊδα, Ροδίτης, Μεσσιανή, Βαθύλακκος, Αμυγδαλιά, Ανατολή, Σταυρωτή, Κοντοβούνι, Πύργος, Σπάρτο, Καισαρεία, Κήπος, Αιανή).

3. Κερασιά

Πρωθούνται οι ποικιλίες BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, LAPINS οι οποίες σταυροεπικονιάζονται μεταξύ τους καθώς και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER η οποία σταυροεπικονιάζεται με τις ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΙΚΑ σε κατάλληλες τοποθεσίες σ' όλο το Νομό.

4. Ροδακινιά

Επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύρηνια ροδάκινα και νεκταρίνια προωθούνται μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, για διεύρυνση της περιόδου συγκομιδής και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα για την εξυγίανση της κοινοτικής παραγωγής ροδακίνων και νεκταρινιών (Καν (ΕΚ) 2200/97 & 2467/97).

α) Επιτραπέζια ροδάκινα

Από τις πρώιμες ποικιλίες οι MAY CREST, SPRING CREST, SPRING LADY και SPRING BELL καθώς και οι ποικιλίες JUNE GOLD, MARAVILHA, FLORIDA KING. Από τις μεσοπρώιμες ποικιλίες προωθούνται οι RUBY RICH και ROYAL GLORY RED HAKEN , SUN CLOUD , MARIA BIANCA , SUN CREST.

Από τις όψιμες ποικιλίες οι CREST HAVEN, O-HENRY, ETOIL, SYMPHONY, FAYETTE , HONEY DEW HALLE , FLAMINIA και ΧΑΛ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥY , λόγω της ιδιαίτερης προσαρμοστικότητάς της στο μικροκλίμα της περιοχής .

β) Συμπύρηνια ροδάκινα

Από τις πρώιμες προωθούνται οι ποικιλίες KATEPINA, FORTUNA, Ι.Φ.Δ Α37.

Από τις μέσης ωρίμανσης ποικιλίες προωθείται η Ι.Φ.Δ. 1842

Από τις όψιμες, η ποικιλία EVERTS για κλιμάκωση της παραγωγής

Από τις πολύ όψιμες η Ι.Φ.Δ. Ε 45

Το υποκείμενο για όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι το σπορόφυτο ροδακινιάς, όταν πρόκειται για μέσης σύστασης-γόνιμα αρδευόμενα εδάφη ή το αμυγδαλοροδάκινο GF677 όταν πρόκειται για ασβεστούχα εδάφη ή για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων.

γ) Νεκταρίνια

Από τις πρώιμες ποικιλίες οι ANDRIANA, RITA STAR και CALTESE 2000

Από τις μεσοπρώιμες οι ποικιλίες SPRING RED, BIG TOP, CALTESE 2010, STARK RED GOLD.

Από τις όψιμες οι ποικιλίες VENUS, FANTASIA, ORION, MORSIANI 90, LADY ERRICA, MORSIANI 51, TASTY FREE και CALIFORNIA.

5. Ελιά

Η ελιά καλλιεργείται ως διατηρούμενη καλλιέργεια στην καθορισθείσα από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Κοζάνης ελαιουργική ζώνη. Ήτοι Πολύφυτο (παραποτάμια περιοχή), Αγία Κυριακή, Βελβεντό (από οικισμό προς παραλίμνια περιοχή), Πλατανόρρευμα, Σέρβια, Ν. Λάβα, Κρανίδα, Αυλές, Γούλες, Ρύμνιο, Ελάτη (παραλίμνια), Φρούριο (παραλίμνια), Πολύμυλος (παραποτάμια περιοχή), Ίμερα, Αύρα, Λεύκαρα, Νεράιδα, Ροδίτης, Κουβούκλια, Μεσσιανή, Βαθύλακκος, Αμυγδαλιά, Ανατολή, Σταυρωτή, Κοντοβούνι, Πύργος, Σπάρτο, Καισαρεία, Κήπος, Αιανή, Πετρανά (Νότια οικισμού), Κρόκος (Νότια οικισμού), Άνω Κώμη, Κάτω Κώμη, Καρυδίτσα, Λευκόβρυση (Νότια οικισμού), Άργιλλο (Νότια οικισμού), Λευκοπηγή (Νότια οικισμού), Πρωτοχώρι (Νότια οικισμού), Ροδιανή (Νότια οικισμού), Αγ. Παρασκευή, Κερασιά, Μηλιά, Κτένι (Νότια οικισμού), Πολύρραχος, Προσήλιο.

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Καρυδιά

Πρωθείται σε κατάλληλες τοποθεσίες σε ολόκληρο το Νομό, εκτός των περιοχών που κατασκευάζονται – επεκτείνονται τα εργοτάξια της ΔΕΗ και που είναι υπό απαλλοτρίωση και σε περιοχές που επικρατούν θύλακες παγετού.

Ποικιλίες που προωθούνται είναι όλες που επιτόπια καλλιεργούνται στο Νομό όπως σπορόφυτα Τσοτυλίου, FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE, HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE, καθώς και άλλες (PEDTRO κ.λ.π). Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

2. Φυσικιά

Πρωθείται η ποικιλία Αιγίνης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Πολυφύτου και μέχρι υψόμετρο 360 μέτρα και η θερμοκρασία του χειμώνα να μην είναι χαμηλότερη των - 6° C.

3. Καστανιά

Πρωθούνται όλες οι ποικιλίες που καλλιεργούνται ή αυτοφύονται στο Νομό με επιτυχία (εμβολιασμένες με MARONIA) οι οποίες δεν παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα προβολής στον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA και στις παρακάτω περιοχές :

α) Επαρχία Κοζάνης

Κατάλληλες τοποθεσίες των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καστανιάς, Π. Λάβας (Δήμου Σερβίων), Πλατανορέυματος και Πολυμύλου.

β) Επαρχία Βοΐου

Κατάλληλες τοποθεσίες των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δαμασκηνιάς, Δραγασιάς, Κλεισώρειας, Ζώνης, Πολυκαστανίου, Αγίων Αναργύρων, Δάφνης, Αυγερινού, Βυθού, Πενταλόφου, Διλόφου, Αγίας Σωτήρας, Μόρφης, Κορυφής, Χρυσαιγής, Λούβρης, Κριμινίου, Ροδοχωρίου, Βουχωρίνας, Ανθούσας και Τριάδας.

γ) Επαρχία Εορδαίας

Κατάλληλες τοποθεσίες των Δημοτικών Διαμερισμάτων Εμπορίου, Αναρράχης, Μηλοχωρίου, Φούφα και της κοινότητας Βλάστης.

II. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Γενικά δεν κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα, η κάλυψη κηπευτικών με θέρμανση.

Δύναται να γίνει καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη με θέρμανση (θερμοκήπια) κατά μήκος των αγωγών τηλεθέρμανσης των Δήμων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, εφόσον η θέρμανση είναι φθηνή.

Συνιστάται η απλή κάλυψη (χωρίς θέρμανση). Η ελάχιστη έκταση για κάθε γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον 1 στρέμμα. Τα θερμοκήπια να είναι τυποποιημένα εγκεκριμένου τύπου.

Πρωθούνται για καλλιέργεια :

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

2. Αγγούρια υπό κάλυψη

Βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια που έχουν δοκιμασθεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στην περιοχή.

3. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση.

4. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, μαρουλιών, κολοκυθιών, φασολάκια και φυλλώδη λαχανικά (πράσινες σαλάτες, σαλάτες διαφόρων χρωμάτων κ.λ.π.).

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

6. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

7. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμώδεις κυρίως περιοχές της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ.

8. Πατάτα

Πρωθούνται ποικιλίες που έχουν δοκιμασθεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στις τοπικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση.

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, τομάτα κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκια, μπάμιες, αγγουράκια, σπανάκι και φυλλώδη λαχανικά στις προσφερόμενες περιοχές του Νομού.

10. Μανιτάρια

Πρωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP., LENDINUS, EDODES κλπ. με βασική προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της περιοχής (τοποθεσίας) που θα εγκατασταθεί η καλλιέργεια.

11. Γενικά

Για όλα τα υπαίθρια κηπευτικά προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική, με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής, όπως χαμηλή κάλυψη, εδαφοκάλυψη κ.λ.π.

Όσον αφορά τις νέες ποικιλίες και υβρίδια θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους στις τοπικές συνθήκες και ευνοούνται από το μικροκλίμα της περιοχής και το έδαφος σε ποιοτικά εδάφη ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στη ζήτηση της αγοράς και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Με βάση τον Καν. 1493/99 απαγορεύεται η επέκταση της αμπελοκαλλιέργειας οινοποιήσιμων ποικιλιών μέχρι το 2010, εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές Διατάξεις.

III. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ)

A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

(Θερμοκήπια – ανθοκήπια). Βασική προϋπόθεση αποτελεί η καταλληλότητα του φορέα για την προώθηση της δραστηριότητας αυτής. **Προωθούνται**

1) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, βολβοειδή, κ.λ.π.

2) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

3) Γλαστρικά

Ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, αζαλέα, γαρδένια, κ.λ.π.

4) Πολλαπλασιαστικό υλικό

Τα θερμοκήπια θα είναι σύγχρονα, τυποποιημένα, εγκεκριμένου τύπου (θερμαινόμενα, με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα κ.λ.π.)

B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Δεν προωθείται στο Νομό, γιατί είναι αδύνατη η παραγωγή ανθέων στην ύπαιθρο από τον Οκτώβριο έως και Απρίλιο.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται, α) η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους, β) ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά και μηχανήματα, σύμφωνα πάντοτε με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας, πολλαπλασιαστικό υλικό, έγγειες βελτιώσεις, σύστημα άρδευσης, μηχανήματα, εργαλεία, κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού, σύστημα ύδρευσης για πρωίμηση της παραγωγής.
3. Για την καλλιέργεια των μανιταριών, προωθείται η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής (ειδικών θαλάμων), με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη γεωργική εκμετάλλευση θα εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για τα αμπελοειδή ισχύουν όσα αναφέρονται στους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
5. Πρωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων – ριζωτηρίων για κηπευτικά, δενδροκομικά, ανθοκομικά είδη και υποστέγων σκίασης για τα ανθοκομικά είδη, τυποποιημένα θερμοκήπια εγκεκριμένου τύπου.

4. Περιοχή Νομού Φλώρινας

Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές των Δήμων Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Περάσματος και Μελίτης και όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους.

Τα είδη και οι ποικιλίες των οπωροκηπευτικών καλλιεργειών τα οποία θα προωθηθούν στην εν λόγω περιοχή είναι τα παρακάτω :

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

A. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1. Μηλιά

Μόνο σε περιοχές των νομών όπου δεν έχουν εμφανισθεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφούς βλάστησης.

- α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, RED CHIEF, OREGON SPUR, STARKING & STAR CRIMSON (τύπος SPUR) και STAR CRIMSON TOP RED
- β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι REINDEERS, SMOOTHIE και GOLDEN B.
- γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED, με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο (2) διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.
- δ) Από τις πρώιμες η ποικιλία GALA και ειδικά οι κόκκινες μεταλλαγές της.
- ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές καθώς και όπου προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων.
- στ) Από τις όψιμες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της FUJI RED, NAGAFU 12, LYND SPUR, KIKU 8. Επίσης η ποικιλία PINK LADY στις ημιορεινές περιοχές.
- ζ) Η ποικιλία GRANNY SMITH.
- η) Η Ελληνική ποικιλία ΦΥΡΙΚΙ, ιδιαίτερα οι μεγαλόκαρπες μεταλλαγές της.

Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα M9, M26 και MM106 στις ορεινές και ημιορεινές, αρδευόμενες περιοχές του Νομού Φλώρινας. Οι κλώνοι τύπου SPUR εμβολιάζονται μόνο στα ημιανάνα υποκείμενα MM106, MM111, καθώς επίσης και σε σπορόφυτα, λόγω καλής στήριξης των δένδρων από τις χιονοπτώσεις.

Για επαναφύτευση στα ορεινά χρησιμοποιούνται ζωηρότερα υποκείμενα κυρίως το MM111 και το EM4 όπου υπάρχει πρόβλημα με τη φυτόφθορα.

Οι παραπάνω αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλιών φυτειών μηλιάς για ανδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα εξυγίανσης της παραγωγής (καν. Ε.Κ. 2200/97 & 2467/97) και τα οποία είναι δεσμευμένα δια δεκαπέντε χρόνια.

2. Αχλαδιά

- α)
1. Από τις πρώιμες προτείνονται οι ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 1/6 (Συργιαννίδα) και 7/9 (Καλλιόπη), η BELLA DI GIUGNO, η TOSCA η ETRUSCA , η COSCIA και η SANTA MARIA.
 2. Από τις καλοκαιρινές ποικιλίες η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ (ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ) και η B.C. WILLIAMS (με ενδιάμεσο εμβολιασμό).
 3. Από τις φθινοπωρινές η ABATE FETEL (με ενδιάμεσο εμβολιασμό ή δοκιμαστικά στην κυδωνιά E.M.C), η CASCADE, η CONFERENCE, HIGHLAND, PACKHAMS TRIUMPH και η HARROW-SWEET.
 4. Από τις χειμωνιάτικες , η PASSA CRASSANA για κλιμάκωση της παραγωγής και σαν επικονιαστής της ABATE FETEL.
- β)
- Σε πεδινές περιοχές προωθούνται οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς.
- Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Φλώρινας που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09-01-98 περί “καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών αχλαδιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.
- γ) **Οι ποικιλίες WILLIAMS, HIGHLAND, KAIZER, HARROW-SWEET προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για βιομηχανική χρήση.**

3. NASHI

Σε περιοχές με κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να καλλιεργηθεί το Nashi και οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες HOSUI, KOSUI, CHOJURO & NIJJISEIKI.

B. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ

1. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, VOGUE, LARIAN και με τους κατάλληλους επικονιαστές στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

2. Ροδακινιά

Επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύρηνα ροδάκινα και νεκταρίνια προωθούνται μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, για διεύρυνση της περιόδου συγκομιδής και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα για την εξυγίανση της κοινοτικής παραγωγής ροδακίνων και νεκταρινιών (Καν (ΕΚ) 2200/97 & 2467/97).

α) Επιτραπέζια ροδάκινα

Από τις πρώιμες ποικιλίες οι MAY CREST, EARLY CREST, RICH MAY, FRANCOISE, SPRING CREST, SPRING LADY και SPRING BELL καθώς και οι ποικιλίες JUNE GOLD, MARAVILHA, FLORIDA KING.

Από τις μεσοπρώιμες ποικιλίες προωθούνται οι RUBY RICH και ROYAL GLORY.

Από τις όψιμες ποικιλίες οι CREST HAVEN, O-HENRY, ETOIL, SYMPHONY, και δοκιμαστικά η ποικιλία TRADY BELL.

β) Συμπύρηνα ροδάκινα

Από τις πρώιμες προωθούνται οι ποικιλίες KATEPINA, FORTUNA, Ι.Φ.Δ Α37.

Από τις μέσης ωρίμανσης ποικιλίες προωθείται η Ι.Φ.Δ. 1842

Από τις όψιμες, η ποικιλία EVERTS για κλιμάκωση της παραγωγής

Από τις πολύ όψιμες η Ι.Φ.Δ. Ε 45

Το υποκείμενο για όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι το σπορόφυτο ροδακινιάς, όταν πρόκειται για μέσης σύστασης-γόνιμα αρδευόμενα εδάφη ή το αμυγδαλο-ροδάκινο GF677 όταν πρόκειται για ασβεστούχα εδάφη ή για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων.

γ) Νεκταρίνια

Από τις πρώιμες ποικιλίες οι ANDRIANA, RITA STAR και ROSE DIAMOND.

Από τις μεσοπρώιμες οι ποικιλίες SPRING RED, BIG TOP.

Από τις όψιμες οι ποικιλίες VENUS, FANTASIA, ORION, MORSIANI 90 και TASTY FREE και CALIFORNIA

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες :

- GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAL ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

2. Καστανιά

Οι καλλιεργούμενες στο Νομό ντόπιες ποικιλίες καθώς και η ποικιλία ΒΟΛΟΥ και κάθε ποικιλία που δεν προσβάλλεται από τον μύκητα ENDOETHIA PARASITICA.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Όσον αφορά την άμπελο, προωθούνται οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην απόφαση 237077/27-02-2004 «περί ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει.

Με βάση τον Καν. 1493/99 (ΝΕΑ ΚΟΑ) απαγορεύεται η επέκταση της αμπελοκαλλιέργειας οινοποιήσιμων ποικιλιών, εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και εφόσον οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται βάσει αδείας της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Φλώρινας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές Διατάξεις.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Πρωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών :

1. Τομάτα υπό κάλυψη:

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Εξ αυτών ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, ΗΛΕΚΤΡΑ, RONITA, κ.λ.π.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμασθεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα CADOR, VENUS, KAMEPON, LUBERON, IMANOL, κ.λ.π.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς πεππονοειδών, μαρούλια, φασολάκια, φυλλώδη λαχανικά (πράσινες σαλάτες κλπ) και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη:

Πρωθούνται οι ποικιλίες DOUGLAS, USO GRANTE, κ.λ.π.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο:

Πρωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες ERATO F1, CORBI F1, GALLI, κ.λ.π., εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση και οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη του Νομού μας.

7. Πατάτα:

Πρωθούνται ποικιλίες που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες όπως οι Sprunta, Agría, κ.α.

8. Φράουλα στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες με ιδιαίτερη προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στις καλλιέργειες υπό κάλυψη στις προσφερόμενες περιοχές του Νομού και είναι κατάλληλες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Τοματοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, τομάτα, μπάμια, αγγουράκι, σπανάκι, φυλλώδη λαχανικά στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

10. Μανιτάρια:

Πρωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP, LENDINUS EDODES (κινέζικο),

AGROCYBE AEGERYTA, TRUFFLES (ασκομύκητας) στις κατάλληλες περιοχές του Νομού και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

IV. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ - ΣΜΕΟΥΡΑ

Εκεί που οι εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών RUMBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRYTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS, RUMBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM & RIMBES SATIVUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους.

V. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, βολβοειδή, κ.λ.π.

β) Γλαστρικά

Γαρδένια, Αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κ.α.

γ) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

VI. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται :
 - α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους
 - β) Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα, κ.ά., συστήματα για φυτοπροστασία και άλλα, σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.
 - γ) συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας :
 - α) πολλαπλασιαστικό υλικό
 - β) έγχειρες βελτιώσεις
 - γ) σύστημα άρδευσης
 - δ) μηχανήματα – εργαλεία, κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του σπαραγγιού
 - ε) σύστημα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.
3. Για τις καλλιέργειεςμανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγήςμανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

Περιοχή Αμυνταίου

Περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Αμυνταίου, Αετού, Φιλώτα, με όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματά τους και τις Κοινότητες Νυμφαίου, Βαρικού, Λεχόβου.

I. Δενδρώδη

A. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1. Μηλιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

2. Αχλαδιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

3. NASHI

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

B. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Κερασιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

2. Ροδακινιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας

3. Νεκταρίνια

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Καρυδιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

2. Καστανιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Πρωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών :

1. Τομάτα υπό κάλυψη:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

4. Φράουλα υπό κάλυψη:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

7. Πατάτα:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

8. Φράουλα στην ύπαιθρο:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

10. Μανιτάρια:

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

IV. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ - ΣΜΕΟΥΡΑ

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

V. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

β) Γλαστρικά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

γ) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

VI. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

Περιοχή Πρεσπών

Αυτή περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές του Δήμου Πρεσπών με όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και την Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής.

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

A. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1. Μηλιά

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

2. Αχλαδιά

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

3. NASHI

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

B. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Κερασιά

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

2. Ροδακινιά

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας

3. Νεκταρίνια

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Καρυδιά

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

2. Καστανιά

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

IV. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ - ΣΜΕΟΥΡΑ

Ομοίως όπως στην περιοχή Φλώρινας.

V. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

VI. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ποικιλίες που αναγράφονται στην περιοχή της Φλώρινας.

**Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας**

Ανδρέας Λεούδης